

**UPUTSTVO ZA LEK**

**Panadol<sup>®</sup> Extra Advance**  
**film tableta , 500 mg +65 mg**  
**Pakovanje: 12 film tableta, blister, 1 x 12 film tableta**

Proizvođač: **GlaxoSmithKline Dungarvan Limited**

Adresa: **Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska**

Proizvođač: **Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG**

Adresa: **Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemačka**

Nosilac dozvole: **Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd**

Adresa: **Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija**

---

Panadol<sup>®</sup> Extra Advance, 500mg+ 65mg, film tableta  
paracetamol, kofein

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.**

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panadol Extra Advance, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

**U ovom uputstvu pročitacete:**

1. Šta je lek Panadol Extra Advance i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol Extra Advance
3. Kako se upotrebljava lek Panadol Extra Advance
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Panadol Extra Advance
6. Dodatne informacije

---

## 1. ŠTA JE LEK PANADOL EXTRA ADVANCE I ČEMU JE NAMENJEN

*Panadol Extra Advance* sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu) i kofein koji svojim dejstvom pojačava dejstvo paracetamola.

*Panadol Extra Advance* omogućava bržu apsorpciju leka u odnosu na tablete paracetamola i kofeina sa standardnom formulacijom. Ovaj lek ublažava glavobolju, migrenu, bol u leđima, reumatske bolove, mišićni bol, neuralni bol, zubobolju i menstrualne bolove. **Panadol Extra Advance** snižava povišenu telesnu temperaturu i ublažava bol kod prehlade i gripa.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL EXTRA ADVANCE

**Lek Panadol Extra Advance ne smete koristiti:**

- *Sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.*
- *Ako ste alergični na paracetamol, kofein ili neki drugi od gore nabrojanih sastojaka*
- *Ako ste mlađi od 12 godina*

**Pre nego što uzmete lek Panadol Extra Advance, konsultujte svog lekara ili farmaceuta:**

- *Ako koristite metoklopramid ili domperidon za lečenje mučnine ili povraćanja*
- *Ako koristite holestiramin za lečenje povišenog nivoa holesterola*
- *Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima*
- *Ako koristite antikoagulanse (lekove koji razređuju krv, na primer varfarin), ili morate duže vreme svakodnevno da uzimate lekove protiv bolova. Panadol Extra Advance možete da uzmete povremeno*
- *Ako glavobolja postane uporna obratite se lekaru*
- *U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre*

*Izbegavajte preteranu upotrebu kafe i čaja kada koristite ovaj lek.*

**Uzimanje leka Panadol Extra Advance sa hranom ili pićima**

Hronična upotreba alkohola povećava rizik od oštećenja jetre kod pacijenata koji uzimaju paracetamol.

**Primena leka Panadol Extra Advance u periodu trudnoće i dojenja**

Zbog kofeina koji ulazi u sastav ovog leka, lek ne treba koristiti ako ste u drugom stanju ili dojite.

**Uticaj leka Panadol Extra Advance na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

---

Nije poznato da upotreba leka u uobičajenim dozama utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili na rukovanje mašinama.

### **Važne informacije o nekim sastojcima leka Panadol Extra Advance**

Natrijum-metilparahidroksibenzoat (E219), natrijum-etilparahidroksibenzoat (E215), natrijum-propilparahidroksibenzoat (E217) mogu izazvati alergijske reakcije (moguće odloženog karaktera).

### **3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL EXTRA ADVANCE**

*Ukoliko mislite da lek Panadol Extra Advance suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.*

Odrasli i deca iznad 12 godina:

Uzmite 2 tablete zajedno sa vodom na svaka 4 sata. Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 tableta u toku 24 časa.

Ne sme se premašiti preporučena doza.

Ukoliko simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.

Osim ukoliko nije pod nadzorom lekara, produžena kontinuirana primena ovog leka može biti štetna.

Izbegavajte istovremenu primenu kafe, čaja i drugih proizvoda koji sadrže kofein, zbog mogućih neželjenih dejstava kofeina (nesanica, drhtanje mišića, nelagodan osećaj u grudima).

#### **Ako ste uzeli više leka Panadol Extra Advance nego što je trebalo**

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Panadol Extra Advance nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!

*U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.*

#### **Ako ste zaboravili da uzmete lek Panadol Extra Advance**

*Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!*

#### **Ako naglo prestanete da uzimate lek Panadol Extra Advance**

Nije primenljivo.

### **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

---

Kao i ostali lekovi, i lek Panadol Extra Advance može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva: kožni osip, alergijske reakcije, otežano disanje (ovo se češće javlja ukoliko ste već imali problem prilikom ranije primene ibuprofena ili aspirina), povišen krvni pritisak, glavobolju, vrtoglavicu, stomachne tegobe (mučnina ili proliv), probleme sa spavanjem, lupanje srca i poremećaje krvi- trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i belih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje koje ne možete da objasnite. Ovi efekti bi trebalo da nestanu nakon prekida primene leka.

## 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL EXTRA ADVANCE

### Rok upotrebe

2 godine.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

### Čuvanje

Lek Panadol Extra Advance držati van domašaja i vidokruga dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Šta sadrži lek Panadol Extra Advance

Svaka tableta Panadol Extra Advance kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola i 65 mg kofeina.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tabletnog jezgra: skrob, preželatizovan; kalcijum-karbonat; alginska kiselina; krospovidon; povidon (K-25); magnezijum-stearat; smeša natrijum parabena: *Natrijum-metilparahidroksibenzoat* (E219); *Natrijum-etilparahidroksibenzoat* (E215); *Natrijum-propilparahidroksibenzoat* (E217).

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) tablete: Opadry White (YS-1-7003); *Titanijum-dioksid*, *hipromeloza 2910 (3 cp)*, *hipromeloza 2910 (6 cp)* *makrogol 400*, *polisorbat 80*; karnauba vosak.

### Kako izgleda lek Panadol Extra Advance i sadržaj pakovanja

Film tableta. Bele do skoro bele film tablete ovalnog oblika, sa na jednoj strani utisnutim xPx, sa P unutar kruga. Gotov proizvod je pakovan u neprovidne blistere od 250 µm PVC/20 µm Al folije ili 300 µm PVC/20 µm Al folije. Pakovanje od 12 film tableta je kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 12 tableta (1 x 12).

### Nosilac dozvole i Proizvođač

**Nosilac dozvole:**

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd  
Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija

**Proizvođač:**

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited  
Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska

**Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG**  
**Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemačka**

**Napomena:**

*Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.*

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Novembar, 2015.

**Režim izdavanja leka:**

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

**Broj i datum dozvole:**

515-01-8076-11-001 od 18.03.2013.